

IMPORTANT

1. Surveiller la date d'expiration de la trousse de Glucagon. Il peut être utile de noter la date dans votre agenda. **Ne pas utiliser après cette date.**
2. Une fois que la personne a repris conscience, il est nécessaire d'identifier la cause de l'hypoglycémie sévère et de communiquer avec le médecin ou un membre de l'équipe de soins.


Des soins prodigués par un service d'urgence à domicile ou un transport rapide vers l'urgence de l'hôpital sont nécessaires après l'administration du glucagon.

Cette publication est une production du Centre régional du Diabète de Laval. Toute modification de la présente publication doit être autorisée par l'établissement. Janvier 2016

Validé par la DSI – janvier 2015

Centre régional du Diabète
1515, boul. Chomedey
Laval (Québec) H7V 3Y7
Tél. : (450) 978-8607
Télécopieur : (450) 978-8614

ADMINISTRATION DE GLUCAGON



Centre intégré
de santé
et de services sociaux
de Laval

Québec 

Québec 

Le glucagon est un **médicament d'urgence** vendu sans ordonnance qui permet d'augmenter la glycémie en situation d'hypoglycémie sévère.

On le donne lorsque **la personne ne peut pas avaler ou qu'elle est inconsciente.**

1. Appeler le 911;
2. Faire une glycémie capillaire si possible;
3. Administrer le **glucagon** par voie sous-cutanée si la glycémie est inférieure à 4 mmol/L ou si la personne inconsciente est connue diabétique.


IMPORTANT

Traiter l'hypoglycémie en tout temps, même si celle-ci survient juste avant le repas.

Technique de préparation et d'administration



Retirer le sceau de la fiole en poussant vers l'arrière;




Retirer le capuchon de l'aiguille;




Insérer l'aiguille dans la fiole et injecter tout le liquide de la seringue dans la fiole;



Sans retirer l'aiguille de la fiole, agiter doucement jusqu'à dissolution complète;



Tout en gardant l'aiguille dans le liquide, aspirer lentement la solution dans la seringue;



Injecter la dose dans le haut de la cuisse.